
### 拒絕毒害 人生無礙

臺中市石岡區衛生所

### 毒品的種類



### 毒品分類

第一級	第二級	第三級	第四級
1. 海洛因	1. 安非他命	1. FM2	1. Alprazolam
2. 嗎啡	2. MDMA	2. 小白板	(蝴蝶片)
3. 鴉片	(搖頭丸)	3. 丁基原啡因	2. Diazepam (安定、煩寧)
4. 古柯鹼	3. 大麻	4. Ketamine	3. Lorazepam
	4. LSD	(愷他命)	4. Tramadol
	(搖腳丸、一粒沙)	5. Nimetazepam	(特拉嗎竇)
	5. Psilocybine	(一粒眠、K5、紅	
	(西洛西賓)	豆)	

### 毒品種類:毒品分為四級



分級	第一級 毒品	第二級毒品	第三級毒品	第四級毒品
常見濫用藥物	海洛因嗎啡鴉片古柯鹼	安非他命 MDMA (搖頭丸) 大麻 LSD (搖腳丸、 一粒沙)	FM2 小白板 丁基原啡因 Ketamine (K他命)	Alprazolam (蝴蝶片) Diazepam (安定、煩寧) Lorazepam (一粒眠)







### 毒品的相關罰則

- 1、製造、運輸、販賣第一級毒品者,處死刑或無期徒刑;處無期徒刑者,得併科新臺幣<u>二千萬元以下</u>罰金
- 2、製造、運輸、販賣第二級毒品者,處無期徒刑或七年 以上有期徒刑,<u>得併科新臺幣一千萬元以下</u>罰金。
  - 3、製造、運輸、販賣第三級毒品者,處五年以上有期 徒刑,得併科新臺幣七百萬元以下罰金

## 毒品的危害



### 毒品使用前、後差別



### 拉k少女 膀胱容量萎縮剩10cc 自由時報 97.6.11

[記者林相美、魏怡嘉/台北報導]台灣尿失禁防治協會理事長郭漢崇表示,近年來全台陸續收到吸食K他命導致慢性膀胱發炎案例,有一名19歲少女,因拉K膀胱萎縮到只剩下10到20CC容量,由於膀胱容量只剩下一點點,被迫整天坐在馬桶上。

### 吸K導致膀胱炎案例遞增

台北市書田診所近3年接獲68例因吸食



### 膀胱無法再回復原容量

林儒廷表示,治療時患者必須停用K他命,以愛密羅藥物緩解排尿慾望,輔以訓練,控制排尿。不過,膀胱纖維化為不可逆,膀胱容量最多只能恢復到200CC,不可能回復到過去的容量。

血尿、小腹疼痛,加上原有憂鬱、失眠,夜晚幾乎無法入睡,曾於其他醫院求診,只能以抗生素、類固醇緩解症狀,無法根治;經問診,病患坦承吸食K他命兩年,檢查發現,病患膀胱明顯縮小,只有100CC容量,正常人的膀胱容量為400CC,而男子的餘尿50CC,代表收縮力變差。林儒廷指出,患者中男性42人、女性26人,平均年齡26歲,最小的僅19歲,吸食K他命時間從半年到3年不等,患者尿液中有極高濃度的K他命代謝物。他分析,長期吸K會造成發炎細胞增生,泌尿系統出現廣泛的炎症反應,膀胱長期、反覆發炎,膀胱有很多出血性的黏膜,最終導致膀胱壁纖維化、變厚,膀胱容量縮小。

### 吸毒的危害

毒品會對腦中樞神經造成影響「吸毒者爲達到預期的效果・往往需要反覆增加使用量,常常會在不知不決覺的情況下過量使用・造成中毒現象,依賴毒品。一但終止或減少使用毒品,身體即會產生流淚、打哈欠、嘔吐、腹痛、痙攣、焦躁不安及強烈渴求藥物等戒斷症狀。吸毒成癮者在持續使用毒品的情況下・極難戒絕,終其一生難以擺脫毒品的束縛。除了會嚴重影響個人健康外・還會面臨失業、求職不易、朋友疏離、婚姻破裂、家庭破碎、自尊受創,而無法適應社會,甚至不惜以暴力或偷竊等不正當的手段謀財,以設法取得毒品,造成嚴重的社會問題。



勇敢說不,語 氣堅定、面帶 微笑

藉故離開現場

告訴提供者吸 毒對健康的重 大危害。

# 拒絕毒品的方法

建酸做點別的

告訴提供者毒 縮發作的痛苦

告訴提供者吸 毒是違法行為, 並有刑責。

### 清潔針具使用與推廣





### 美沙冬替代治療

以低毒性藥物來取代高毒性毒品

*美沙冬為合成鴉片類製劑*,用低成癮性的藥物代替高成癮性的毒品,在消除戒斷症狀後,定期給戒毒者美沙冬進行維持,以期使病人恢復正常的生活狀態。













進入給藥處



按壓指紋











醫師處方給藥

個管師查驗身份





交還藥杯











檢查口腔

完成